

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目に

鼻炎用内服薬

ドン12 鼻炎用
カプセル

ドン12 鼻炎用の特長

- (1) 本剤は、ウイルスなどによって起こる急性鼻炎だけでなく、花粉やハウスダストなどによって起こるアレルギー性鼻炎による鼻みず、鼻づまり、なみだ目、くしゃみ等の不快な鼻炎症状を改善するお薬です。
- (2) ヨウ化イソプロパミドが鼻みずや涙が過剰に出るのを抑えます。
- (3) dl-メチルエフェドリン塩酸塩が鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善します。
- (4) 1回1カプセル、1日2回の服用です。

〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能又は効果〕

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

〔用法及び用量〕

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	1 カプセル	2 回（朝・夕）
小児（15歳未満）	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシート表面の凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、カプセルを取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

(3) PTPシートをスリットで分割する時、数回折り曲げてから分割してください。その時、手を切らないようご注意ください。



〔成分及び分量〕

1 日 量（2 カプセル）中に次の成分を含有します。

成 分	含 量	主なはたらき
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	72mg	鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善します。
ヨウ化イソプロパミド	5 mg	鼻みずや涙が過剰に出るのを抑えます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4 mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。
無水カフェイン	100mg	脳の血管に作用して、頭が重い症状をやわらげます。

添加物として、結晶セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ラウリル硫酸ナトリウム及びゼラチンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 開封後はすみやかに使用してください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(5) 使用期限（箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。



〔包 装〕

10カプセル、20カプセル、30カプセル

〔販売名〕

ダン12鼻炎用カプセル

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ダンヘルスケア株式会社 お客様相談室

TEL 06-6441-0547

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 **ダンヘルスケア株式会社**

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

製造販売元 **株式会社 廣 貫 堂**

富山県富山市梅沢町2丁目9番1号