

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

PAIR 非ステロイドの治療薬 Method <鎮痒消炎薬> メソッド シート

【気になる肌トラブルを治療するには?】

かゆみなどの肌トラブルを早く治すためには、原因となる汗や汚れなどの刺激物質を取り除くこと、そしてかゆみを感じた時にすぐに症状を抑えてかきむしりを防ぐことが大切です。



「メソッド シート」の特長

- かゆみをすばやく止める
<かゆみ止め成分>ジフェンヒドラミン塩酸塩
 - 炎症を鎮めて赤みやブツブツを抑える
<抗炎症成分>グリチルリチン酸二カリウム
 - 刺激に弱くなった肌を修復する
<肌組織修復成分>アラントイン
- +
- 汗や汚れをふき取りながら有効成分を患部に塗る 薬剤含浸型シート
 - スッキリベタつかないシート
 - 肌へのやさしさを考えた天然コットン100%
 - 無着色、無香料、防腐剤(パラベンなど)・パウダー無配合

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください 粘膜

☒ 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ

3~5日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、あせも、虫され、じんましん、しもやけ

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

第3類医薬品
MADE IN JAPAN
携帯しやすい
個包装タイプ
1枚(3.51mL)×10袋
シートサイズ:130mm×150mm

用法・用量
1日数回、患部に塗布してください。
＜用法・用量＞ 1回の使用量は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。
(1)小児に使用する場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)外用のみ使用してください。(4)強くこすらず、患部にやさしく液を塗布してください。
成分(100mL中) ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g、グリチルリチン酸二カリウム
イソオキシエチレーホリコリコリン・メタクリル酸チアリル共重合体液、エタノール、ラウロマクロゴール、クエン酸、pH調整剤、脱脂粉
保養及び取扱いの注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)金属(ハネナス、時計、アフセサリー等)、木村(白木、床や家具等の塗装面等)、皮製品(靴や鞄)などに付着すると変質又は変色する場合があるので、注意してください。(6)火気や気に近づけないでください。(7)シートは水に溶けないので水洗いしないでください。(8)開封後はすぐにご使用ください。(9)一度ご使用になつたシートは、お使いにならないでください。

非ステロイドの治療薬

第3類医薬品
湿疹・皮膚炎

外出先

でも

汗などによる 急なかゆみ

ふいてすばやく止める!

シートタイプの塗り薬

(デリケートゾーンにも)



PAIR 気になる肌トラブルに
Method
ベタつかない メソッド シート

- ・かゆみを止める
- ・炎症を鎮める
- ・肌を修復する

成分

個包装 10枚