

押しあける

べたつかないクリーム



ご使用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の部位には使用しないでください。(1) 目のまわり、粘膜等 (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位 (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)

**■ 相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## フェルゼアHA20クリーム 第3類医薬品

### 治療のススメ

手指のあれや角化症は、角質層の水分が失われるなどが原因で起きます。そのままにして、乾燥や水仕事などで手を刺激すると、症状がさらにひどくなる場合がありますので、治療薬で、早めに治すことをおすすめします。

〔適応症〕手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌  
※小児(15歳未満)にはご使用できません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。(2) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

製造記号

使用期限

# FERZEA® フェルゼア

## HA20 クリーム

ガサガサ コチコチ  
手あれ・かかと

# 治療薬

80g NET WT. 3 OZ.

第3類医薬品

尿素  
20%  
配合

〔成分・分量〕(1g中) 尿素(うるおいキープ成分)200mg、グリチルリチン酸二カリウム5mg、トコフェロール酢酸エステル5mg

添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘン酸、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、クエン酸Na、水酸化Na、エデト酸Na、パラベン、その他1成分を含有します。

〔用法・用量〕1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。(3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 化粧品ではありませんので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

## ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先 電話:0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN 0819

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931