

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

販売名

貼温膏(はるおんこう)

鎮痛消炎剤 第3類医薬品

成分及び分量 膜体 100g 中

dl-カンフル	1.26g
l-メントール	3.16g
ハッカ油	0.79g
サリチル酸メチル	6.32g
グリチルレチン酸	0.148g
トコフェロール酢酸エステル	0.35g
ノルマルガニルアミド	0.053g

添加物として、ポリプロピレン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、

テルペングリセリン、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-

エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニル

エーテル、天然ゴムラテックスを含有します。

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しほやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関する注意>

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(5) 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。

(6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にははがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

(4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



4 940794 451267

富山市水橋屋等173

製造販売元 大阪市中央区道修町2-1-10

製造販売元 大阪市中央区道修町2-