

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 解熱鎮痛薬

# 小中学生(7才以上15才未満)の生理痛・頭痛・熱に

## 第②類 医薬品 小粒でのみやすい 小中学生用ノーシンピュア<sup>®</sup>

アセトアミノフェン製剤 非ピリシン系・非アスピリン製剤

小中学生用ノーシンピュアは、痛みをおさえる安全性の高い鎮痛成分のアセトアミノフェンに、その効果を高めるアリルイソプロピルアセチル尿素と無水カフェインを配合した、小中学生用(7才以上15才未満)の痛み止めです。

## 特長

- 吸収がよく、小中学生(7才以上15才未満)の生理痛・頭痛によく効きます。
- アセトアミノフェンが痛みをおさえ、アリルイソプロピルアセチル尿素と無水カフェインがそのはたらきを高め、すぐれた鎮痛効果をあらわします。
- 胃にやさしいのに速く効きます。
- 小粒でのみやすいフィルムコーティング錠で、服用時にがみがありません。



## 使用上の注意

本剤は小児用ですが、解熱鎮痛薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

### 1.次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

### 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

### 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがあります。)

### 4.服用時は飲酒しないでください

### 5.長期連用しないでください

## してはいけないこと



### 1.次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

### 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

#### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ
消化器	恶心・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん・浮腫・胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤・火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

### (2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

(裏面につづく)

## 成 分 2錠中

アセトアミノフェン.....200mg  
アリルイソプロピルアセチル尿素.....30mg  
無水カフェイン.....40mg  
添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ、ヒプロメロース、酸化チタンを含有する。



## 効 能

- 1) 生理痛・頭痛・腰痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・肩こり痛・  
抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

次の用量をなるべく空腹時をさせて服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
11才以上 15才未満	2 錠	3回を限度とする
7才以上 11才未満	1 錠	
7才未満の幼児	服用しないこと	

## <用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

(3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている

PTPシートの凸部を指先で強く  
押して裏面のアルミ箔を破り、

取り出して服用してください。 (PTPシートの取り出し図)

(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ  
事故につながります。)



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、  
お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますよう  
お願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎ 0120-225-081

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

受付 : 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

製品情報をホームページでご覧下さい。 [www.arax.co.jp](http://www.arax.co.jp)

**ARAX** 株式会社 アラクス

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26