

## 第2類医薬品

### 刺激に弱い乾燥肌のかゆみを止める (販売名)近江兄弟社メンタームEXソフト

〔効能・効果〕 かゆみ、皮膚炎、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、虫さされ、ただれ  
〔用法・用量〕 1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈次の注意事項を守ってください〉(1)定められた用法・用量を守ってください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。  
(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

〔成分・分量〕 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	働き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	皮膚のかゆみをしずめます。
リドカイン	2.0g	皮膚のかゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	炎症をおさえます。
パンテノール	1.0g	肌の正常な働きを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、症状の回復を早めます。

添加物として、セトステアリルアルコール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール、グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、エデト酸Na水和物、トリエタノールアミンを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

#### △〔使用上の注意〕

##### ⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

次の部位には使用しないでください。

創傷面、目の周囲、粘膜等



##### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

かさついて、かゆい肌には**乾燥対策**と**かゆみ対策**が必要です。

#### 保湿成分

**グリセリン・ワセリン**  
保湿力を高め、かさついた肌をなめらかにします。

乾燥

#### かゆみ止め成分

ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカインがかゆみを止めます。

かゆみ  
炎症

#### 抗炎症成分

グリチルレチン酸  
が肌の炎症をおさえます。

#### パンテノール

肌の正常な働きを  
高めます。

#### トコフェロール

酢酸エステル  
血行を促進し、症状の回復を早めます。

- お子様が、がまんできずにかきむしる。
- 粉をふいたように肌がカサカサしてかゆい。
- 寝る時や体が暖まった時、ムズムズかゆくなる。
- 下着の締めつけによるかぶれ・皮膚炎に。



本剤には尿素・ステロイド成分は配合していません

お問い合わせ先 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135  
受付時間：午前8:30～午後5:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 近江兄弟社  
滋賀県近江八幡市魚屋町元29

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/  
TEL.0120-149-931

〔容量〕90g

MADE IN JAPAN