

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

生薬製剤
300錠
(15錠×20日分)

押して開ける

第3類
医薬品

販売名: [クラシエ]ヨクイニン錠

〈成分〉
成人1日の服用量15錠(1錠340mg)中
ヨクイニン末…4,200mg
添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、
ステアリン酸Mgを含有する。
(成分に関連する注意) 本剤は天然物(ヨクイニン)
を用いていますので、錠剤の色が多少異なる
ことや、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られ
ることがあります。また、ヨクイニン特有のにおい
を感じることがあります。

〈効能〉
いぼ、皮膚のあれ

〈用法・用量〉
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。
成人(15才以上)…1回5錠
15才未満は服用しないこと

発売元 製造販売元
クラシエ 薬品株式会社 クラシエ 製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20(F108-8080) 東京都港区海岸3-20-20(F108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 副作用被害救済制度
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く) の問合せ先 ☎0120-149-931

製造
番号
使用
期限

05041

△ 使用上の注意

☞ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

錠剤

いつでもそばに

20日分

漢方セラピー



クラシエの漢方

ヨクイニン

T-8

300錠

肌あれの方、
イボのある方に

300錠



ビン入りの錠剤です。



責任ある木質資源を
使用したパッケージ
FSC® C157845



このお薬の詳しい説明を
動画でチェック!

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

第3類医薬品