

Kracie

48錠

漢方セラピー ズズズする頭痛、頭痛からくる吐き気に



呉茱萸湯
ゴ シュ ユ トウ

T-38

〈効能〉

体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 2錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

〈成分〉

成人1日の服用量6錠(1錠360mg)中

呉茱萸湯エキス(1/2量)…1,350mg

(ゴシュユ1.5g、ショウキョウ0.5g、ニンジン1.0g、タイソウ2.0gより抽出。)

添加物として、タルク、クロスCMC-Na、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、三二酸化鉄、酸化鉄、カルナバロウを含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

製造販売元

クラシエ 薬品株式会社 大峰堂薬品工業株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080) 奈良県大和高田市根成柿574(〒635-0051)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先☎0120-149-931

※< 切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

チャック

第2類医薬品

漢方製剤 呉茱萸湯エキス錠クラシエ

ゴシュユトウ

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1ヵ月位(しゃっくりに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



PE, 金属

製造番号

使用期限

H01 7