

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面およびボトル裏面に記載）を
過ぎた製品は使用しないこと



コンタクトレンズを
はずした後に

押して開ける

アイボン^d

Eyewash 洗眼薬

コンタクトレンズを使用していると、目の異物感、かゆみなど不快な症状がおこりがちです。目についたタンパク汚れやほこりを洗い流して、スッキリとさせます

販売名：アイボン^d

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - 眼球乾燥症候群（ドライアイ**）の診断を受けた人
※※医師から病名として診断を受ける程度の人を前提としています
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼してください

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと
また再装着する場合は、洗眼してから10～15分程度あけること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄すること
- 混濁したものは使用しないこと
- 洗眼用のみ使用すること

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
イプシロン-アミノカプロン酸	200mg	抗炎症作用
アラントイン	30mg	角膜修復作用
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	抗炎症作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	10mg	代謝促進作用
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行促進作用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg	角膜保護作用

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、エデト酸Na、l-メントール、d-ボルネオール、pH調整剤を含有する

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところにキャップをしっかりとめて箱に入れて保管すること
- 小児の手の届かないところに保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと
（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 洗眼カップは他の人と共用しないこと

第3類医薬品

使い方

- コンタクトレンズを装着されている場合は、使用前に必ずコンタクトレンズをはずすこと
- 使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいにふきとること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄すること
- 保存状態によって容器の口周辺に白い結晶が付着することがあるので、その場合は清潔なガーゼなどで軽くふきとること
- コンタクトレンズを使っていない人も使用できます



- ① 本剤を添付洗眼カップの内側の線（5 mL）まで入れ、



- ① 目にぴったりと押し当ててください



- ② 次にカップを目に押し当てたまま、液がこぼれないように頭を後ろへそらし、上を向き、



- 数回まばたきをして洗眼してください
- 片方の目を洗った液で反対側の目を洗わないでください
 - 30秒以上洗眼しないでください

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

※防腐剤とはベンザルコニウム塩化物、パラベンなどのことを指します

好みで選べる

アイボン[®] シリーズ



クール感のレベル



ぴったりフィットカップの特徴

- 顔にぴったりフィットするから上向きで洗眼しても、液もれしにくい
- 目の周りが痛くなりやすい
- 目の周りに跡が残りにくい



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品