

第2類医薬品

販売名: シジラック
Medicine for Frozen Shoulder

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面およびパウチ裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

⚠️ 使用上の注意

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: 排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

用法・用量 次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞
(1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量 1日量(12錠)中 独活葛根湯エキス 2860mg

＜原生薬換算量＞ [カクコン2.5g、ケイヒ1.5g、シャクヤク1.5g、マオウ1.0g、ドクカツ1.0g、ショウキョウ0.5g、シオウ2.0g、タイソウ0.5g、カンゾウ0.5g]

添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

効能・効果

体力中等度またはやや虚弱なものの次の諸症: 四十肩、五十肩、肩こり、寝ちがえ

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

特 徴

- 痛くてつらい四十肩、五十肩を体の中から飲んで治す漢方薬です
- 四十肩、五十肩にともなう肩関節の炎症を鎮めます

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社** 製品のお問合せ先(お客様相談室) 製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 ☎0120-5884-01 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp> 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN