

NEW

アンメルツ

ココロA

第3類医薬品

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、
打撲、捻挫、関節痛

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと閉めて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近いこと(エタノール含有物)

- キャップをしっかりとめないと液が漏れることがある
- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ラベル
ポトル
キャップ使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと販売名：ニューアンメルツココロA
External Anti-Inflammatory / Analgesic第3類医薬品 **外用鎮痛消炎剤**

特徴

- ① 鎮痛消炎成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、肩こり、筋肉痛を治療していきます
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、じんじんという温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ③ ニオイが気にならない無臭性です
- ④ 手が汚れず使い易い、ココロポトルです

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 痛み、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 100mL中

サリチル酸グリコール 2500mg
L-メントール 3000mg
クロルフェニランミン酸塩 100mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
ノナン酸バニリルアミド 12mg
添加物として、プロピレングリコール、エタノール、ハアセチルしょ糖を含有する

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
 - (3) 外用にのみ使用すること
● 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと ● 皮膚の特に強い方は、同じ所に続けて使用しないこと ● スポーツや入浴等、汗をかか前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんできれい流すことと緩和します
- 製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いたします

▼ あつたらいな / をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

税 控除対象

MADE IN JAPAN