



押してあける

殺菌・消毒

イソジン® きず薬



きり傷・すり傷
とびひ・おでき
殺菌消毒

外用のみに使用し、
内服やうがいには
使用しないでください。

第3類医薬品

この説明文書は使用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

イソジン®きず薬 第3類医薬品

△使用上の注意

してはいけないこと ㊄

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
次の人は使用しないでください 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果 きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回、患部に塗布してください。[用法・用量に関連する注意] ●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。●本剤は外用のみに使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。●石けんなどの併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落とししてからご使用ください。

成分・分量 1mL中 ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg) 添加物として グリセリン、クエン酸、リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤を含有しています。

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)(4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。(5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



[販売元]
シオノギヘルスケア株式会社
大阪府中央区北浜2丁目6番18号



[製造販売元]
ムンディアファーマ株式会社
東京都港区港南2-15-1

®:登録商標

上手なキズのお手当

- ① お手当の前に石けんで手をよく洗いましょう。
- ② きず口に泥や砂などの異物があれば流水で洗い流しましょう。
- ③ 清潔な綿球などに本剤を十分しみこませ、中心部より外に向かって広めに塗布し、そのまま乾かしてください。

※救急パンなどできず口を保護する場合は、本剤が乾いてからおおってください。

お問い合わせ窓口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

この製品は外側を
透明フィルムで
ラッピングしています。

A61J1
A01