

販売名:ハイゼリーB

(使用上の注意)

相談すること

●次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹
消 化 器	胸やけ、悪心、下痢

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕滋養強壮、肉体疲労・栄養障害・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体质

〔用法・用量〕成人(15才以上)1回1瓶(100mL)を1日1回服用してください。

(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)小児(15才未満)には服用させないでください。

〔成 分〕1瓶(100mL)中 コンドロイチン硫酸ナトリウム300mg・ローヤルゼリー200mg・人参エキス(原生薬換算600mg)90mg・ゴオウ抽出液(原生薬換算2mg)200mg・イカリ草エキス(原生薬換算200mg)20mg・DL-塩化カルニチン50mg・ビタミンB₁塩酸塩10mg・ビタミンB₂リジン酸エステル3mg・ビタミンB₆5mg・シアノコバラミン1μg・ニコチニン酸アミド20mg・バントテン酸ナトリウム10mg・無水カフェイン50mg(アルコール1.0mL以下)



添加物:エチルパラベン、
ブチルパラベン、安息香酸Na、ポビドン、クエン酸D-ソルビトール、白糖、カラメル、香料、L-メントール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、トコフェロール、その他1成分

●本剤に配合されているビタミンB₂リジン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがあります。奏効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用救済制度 ■ 0120-149-931

〔製造販売元〕東京都中央区日本橋小舟町10-11
ゼリア新薬工業株式会社
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

製造番号

使用期限
[年.月]