

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



# 消化酵素配合胃腸薬

# ストマーゼ® 顆粒

STOMASE Granule

### 〔特 徴〕

胃は健康の源です。食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良や生活環境の複雑化に起因するストレス、精神的疲労・不安などによって胃の不調、不快感、機能の衰えなどが起こりがちです。

ストマーゼ顆粒は、こうした症状の改善に働く消化酵素剤、健胃生薬を配合した、のみやすい顆粒状の胃腸薬です。



〔食べ過ぎ〕



〔胃もたれ〕



〔胸やけ〕

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - 透析療法を受けている人。
  - フェニルケトン尿症の人。
- 長期連用しないでください

#### 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。

腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)



## 〔効能・効果〕

消化促進, 食べ過ぎ (過食), 飲み過ぎ (過飲), もたれ (胃もたれ), 消化不良, 胃重, 胃部膨満感, 消化不良による腹部膨満感, 胃部不快感, 食欲不振 (食欲減退), 胸やけ, 胸つかえ, 嘔吐, はきけ (むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔気, 悪心), 胃痛, 胃酸過多, げっぷ (おくび)

## 〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人 (15才以上)	1 包	1日3回, 食後に服用してください。
11才以上 15才未満	2/3包	
8才以上 11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください。	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。

## 〔成 分〕 1日量 (3包) 中

成 分	分 量	は た ら き
ピオチアスターゼ2000	40mg	でんぷん及びたん白質を消化します。
ニューラーゼ	90mg	たん白質及び脂肪を消化し, 栄養の吸収を促進します。
リパーゼA P 6	60mg	脂肪を消化します。
ウルソデオキシコール酸	15mg	脂肪を乳化し, 吸収を助けます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	600mg	胃内の過剰な酸を中和したり, 胃粘膜を保護します。
水酸化マグネシウム	300mg	
ガジュツエキス (ガジュツ300mgに相当)	15mg	特有の芳香と味が消化液の分泌を活発にし, 食欲を増し, 消化を良くし, 胃の働きを整える健胃生薬成分です。
ケイヒ油	4 mg	
ハッカ油	4 mg	

添加物: 乳糖水和物, トウモロコシデンプン, カルメロースカルシウム, ポピドン, D-ソルビトール, アスパルテム (L-フェニルアラニン化合物), ヒドロキシプロピルセルロース

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは, 袋の口を折り返して保管し, 2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは, お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)


ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ストマーゼはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元  
 **ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元  
**日新製薬株式会社**  
山形県天童市清池東二丁目3番1号