

第2類医薬品

殺菌消毒薬

キシロ[®]A軟膏

キシロA軟膏の特徴

- 1.局所麻酔剤リドカイン、抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラミン、殺菌剤セトリミドを配合しています。
- 2.油性の基剤を使用していますので、刺激が少なく、傷口を保護します。



使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

きり傷、すり傷、かき傷、くつずれ、皮膚の殺菌・消毒

使用法

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。
- (5) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

本剤は、白色～微黄色の軟膏で、100g中に次の成分を含有しています。

セトリミド	0.5g
リドカイン	2g
ジフェンヒドラミン	0.5g
添加物：パラフィン、ステアリン酸グリセリン、ソルビタン脂肪酸エステル、ワセリン	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168