

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品 つらいかゆみ、湿疹、皮膚炎に

ベトナベートクリームS

ベトナベートクリームSの特徴

- ベタメタゾン吉草酸エステル(ステロイド成分)が、湿疹、かぶれ等の皮膚の炎症にすぐれた効き目を発揮します。
- のびがよく、べたつかない使い心地のよいクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人には使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜等
- 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

しつしん、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

〈効能・効果に関する注意〉

効能・効果に記載以外の症状では、本剤を使用しないで下さい。

■ 使用法

1日1~数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- 使用法を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。
- 使用部位をラップフィルム等の通気性のわるいもので覆わないで下さい。
- 化粧下、ひげそり後などに使用しないで下さい。



■ 成分・分量

本品は白色のクリーム剤で、100g中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12g	皮膚の炎症をしずめます。 (抗炎症剤・ステロイド成分)

添加物：セトステアリルアルコール、ワセリン、流動パラフィン、クロロクレゾール、
セトマクロゴール、pH調節剤

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

皮膚用薬は、症状に適した薬を選んで使用するようにしましょう。
患部の状態をみながら使用し、症状がおさまったら漫然と使用しない
ようにしましょう。
また、お薬を使用するときは、患部を清潔にしてから使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

08 ®登録商標

製造販売元
グラクソ・スミスクライン株式会社
東京都港区赤坂 1-8-1



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10