

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダストによる アレルギー性鼻炎などの症状に効く **〈鼻炎用薬〉  
第②類医薬品**



# アネトン<sup>®</sup> アルメディ鼻炎錠

プソイドエフェドリン塩酸塩・生薬配合

アネトン アルメディ鼻炎錠は、鼻かぜや、花粉・ハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎にともなう、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの諸症状に優れた効果を発揮します。鼻づまりに効くプソイドエフェドリン塩酸塩と、抗アレルギー作用のあるサイシンエキス、カンゾウ末などの生薬を配合しています。



くしゃみ



鼻みず



鼻づまり



## 使用上の注意



### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

- 次の人は服用しないでください  
(1) 次の症状のある人。  
前立腺肥大による排尿困難  
(2) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去たん薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
- 長期連用しないでください



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。\*  
(4) 高齢者。  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。  
緑内障、腎臓病\*  
(8) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。  
(9) かぜ薬、鎮咳去たん薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人。\*
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状               |
|-------|-------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ         |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振       |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏、けいれん* |
| 泌 尿 器 | 排尿困難              |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症 状                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                           |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】

次の量を、食後に水又はお湯で服用してください。

| 年 齢         | 1 回 量       | 1日服用回数 |
|-------------|-------------|--------|
| 成 人（15歳以上）  | 3錠          | 3回     |
| 11歳以上 15歳未満 | 2錠          |        |
| 11歳未満       | 服用しないでください。 |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

アネトン アルメディ鼻炎錠は淡褐色の錠剤で、成人1日量(9錠)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

| 成 分             | 分 量   | は た ら き                                                 |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|
| ブノイドエフェドリン塩酸塩   | 180mg | 血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善します。                     |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg  | 抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。                           |
| サイシン(細辛)エキス     | 30mg  | 抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。                           |
| カンソウ(甘草)末       | 300mg | 抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。また種々の炎症をおさえて、のどの痛みをやわらげます。 |
| シンイ(辛夷)エキス      | 21mg  | 鼻みず、鼻づまりを改善します。                                         |
| ショウキョウ(生姜)末     | 100mg | 胃腸機能を高め、自然治癒を促進し、鼻炎症状の改善を助けます。                          |
| 無水カフェイン         | 90mg  | 鼻炎にともなう頭重、不快感をやわらげ、又眠気をおさえます。                           |


添加物として、無水ケイ酸、乳糖、バレイショデンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然の生薬も原料としていますので、多少色調の異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4) 1包を服用した残りを保管する場合は、袋の口を封をするように折り返し、5日以内に服用してください。\*  
(5) 使用期限（外箱及び1包に記載）をすぎた製品は服用しないでください。



【包装】

アネトン アルメディ鼻炎錠：45錠・90錠（1包3錠入り）

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

**武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号