

ワンテン Pα

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、 悪心・嘔吐、口内炎

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。
- 生理が予定より早く来たり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談してください
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
便秘、軟便、下痢。

● 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

● 用法・用量

次の量を、水またはお湯と一緒にかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守ってください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っている PTP シートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



●成分・分量

2 カプセル中

ゴオウ……………2mg

ロクジョウ末……………10mg

加工大蒜……………20mg

(ニンニクとして 2000mg)

ローヤルゼリー末……………50mg

シベット散……………5mg

(シベットとして 0.25mg)

ハンピ末……………20mg

カイクジン末……………20mg

ニンジン乾燥エキス……………60mg

(ニンジンとして 870mg)

イカリ草乾燥エキス……………20mg

(インヨウカクとして 150mg)

トコフェロール酢酸エステル……………50mg

フルスルチアミン塩酸塩……………20mg

リボフラビン酪酸エステル……………12mg

ピリドキシン塩酸塩……………15mg

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、エチルセルロース、ケイ酸 Ca、ステアリン酸 Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸 Na・青色 1 号・赤色 102 号・黄色 5 号・ゼラチン(カプセル本体)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは配合成分のリボフラビン酪酸エステルによるもので、ご心配ありません。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

発売元



お客様相談窓口

☎ 0120-329-930

<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場 168