

第2類医薬品

解熱鎮痛薬



販売名
ラックル

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

腰痛・神経痛に早く効く

ラックル® 速溶錠

胃にやさしい 眠くならない

特長

- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。
- 腰痛・神経痛に早く効く飲み薬です。
- 胃にやさしく、眠くなりません。
- カリカリとかみくだくか、軽く口の中で溶かしてから、水と一緒に服用。
- すっきりとしたミント味です。
- 外出時に携帯しやすいシート包装です。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。

用法・用量

成人(15歳以上)、1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて、かみくだくか、軽く口中で溶かした後、水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。15歳未満は服用しないこと。

用法・用量に関する注意

(1) 用法用量を厳守して下さい (2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。



効能・効果

- 腰痛・神経痛・関節痛・ねんざ痛・外傷痛・打撲痛・筋肉痛・骨折痛・肩こり痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛(生理痛)の鎮痛

- 悪寒・発熱時の解熱

販売

日本臓器製薬株式会社

大阪市中央区平野町2-1-2

お客様相談窓口 ☎ 06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

▲ 使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。3. 服用時は飲酒しないで下さい。4. 長期連用しないで下さい。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談下さい (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体质の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍。2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神・神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 せんそく	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg

添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、L-メントール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムカリウム、赤色3号

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

④登録商標

02

第2類医薬品

腰痛・神經痛に早く効く

ラックル®

すぐに溶け出す
速溶錠

胃にやさしい

眠くならない