

第2類医薬品

にきび・吹き出物に

エバユース®にきび薬

日本薬局方 イブプロフェンピコノールクリーム エバユースにきび薬

エバユースにきび薬の特徴

1. にきびの進行をおさえる作用とにきびの炎症をおさえる作用をもつイブプロフェンピコノールが主成分です。
2. のびがよく、べたつかないバニシングクリームで、塗ったあとが目立ちません。



にきび



吹き出物



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ、乾燥化(つっぱり感)

3. 1カ月位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

にきび、吹き出物

使用法

1日数回石けんなどで洗顔後、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) にきび、吹き出物のある部分にのみ使用し、周辺の広い部分や目・目の周辺には使用しないで下さい。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本品は白色～微黄色のクリーム剤で、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量
イブプロフェンピコノール	3g

添加物：セタノール、ステアリルアルコール、セトマクロゴール、流動パラフィン、ワセリン、パラベン、感光素201号

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
久光製薬株式会社
佐賀県鳥栖市田代大官町408