

# かゆいドライスキンに 尿素20%配合

MENTHOLATUM AD20 MILKY LOTION

メンソレータム®



# AD20

販売名:メンソレータム®AD プレミア®乳液20 **第3類医薬品** **乾燥性皮膚用薬**

AD20シリーズは、かゆみをスーッと鎮めることを追求した  
メンソレータムADシリーズの処方に基づきながら、  
さらに、尿素を20%配合することで  
かゆみの原因からケアしていくことを目指した  
アンチ・ドライ スキンケアシリーズです。

## こんな方に……

- ひざ下などが乾燥して、白く粉をふいている方。
- 暖房などで足元が暖まると、乾燥部位がかゆくなる方。
- セーターやストッキングの摩擦などで、乾燥部位がかゆくなる方。

## こんな使い方がおすすめ……

### 入浴後が効果的

お風呂に入り、皮膚の血行・吸収性が  
高められた上で乾燥しやすいところに  
塗りこんでいただくと効果的です。

かゆみをスーッと鎮めるだけでなく、その原因となる  
ドライスキンを改善してしっとりなめらかな素肌をつくります。

## 原因

ドライスキン  
[乾燥肌]

### 尿素20%(角質軟化剤)

高い保湿効果で乾燥した皮膚に水分を集め、  
逃さないようにして皮膚をやわらかくします。

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)  
血行を促進して、皮膚の  
生まれ変わりを活発にします。

## 結果

かゆみ  
炎症

### クロタミトン(鎮痒剤)

かゆみをすばやく、しっかり止めます。

### ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン剤)

かゆみのもとであるヒスタミンの作用を止めます。

### グリチルリチン酸モノアンモニウム(抗炎症剤)

炎症をしずめ、かゆみのもとを抑えます。

かくことで起こした皮膚の炎症もしずめます。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目や目のまわり、粘膜等
  - (2) 引っかき傷等のきすぐち、亀裂(ひび割れ)部位
  - (3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ
  - (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状  |
|------|---|
| 皮フ   | 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ヒリヒリ感)、はれ、かさぶたの様に皮フがはがれる状態、かぶれ、乾燥感 |

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

かゆみをともなう乾燥性皮フ(老人・成人の乾皮症)

## 用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

## 成分(1g中)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 尿素……………200mg                    | 添加物として、 <i>l</i> -メントール、グリセリン、スクワラン、パルミチン酸イソプロピル、キサンタンガム、カラギーナン、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、セタノール、 <i>d,l</i> -ピロリドンカルボン酸Na、pH調節剤、グリシン、トリエタノールアミンを含有する。 |
| クロタミトン……………50mg                 |  |
| ジフェンヒドラミン……………10mg              |  |
| グリチルリチン酸モノアンモニウム……………5mg        |  |
| トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)……………5mg |  |

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

## お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)