

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ひび・あかぎれ治療薬



メンソレータム[®] ヒビプロ^{®α}

第3類医薬品

しっかり覆うワセリンベースの軟膏

水仕事などで手を酷使するあなたに

家事や水仕事などによるつらいひび・あかぎれ症状。でも、家事や水仕事は休めない…。そんなあなたの手を考えて生まれたのがヒビプロ^{®α}です。

ヒビプロ^{®α}は、落ちにくく、カバーラの高い処方設計で有効成分を患部にとどめ、つらいひび・あかぎれの症状を効果的に改善していく治療薬です。



〈密封カバーラ〉+〈6つの有効成分〉で効く

ワセリンベースの軟膏製剤がまるで患部を密封するかのように覆い、6つの有効成分をとどめて、つらいひび・あかぎれを修復していきます。

新陳代謝を促進し
荒れた皮ふをなめらかにする

ビタミンA油

血行促進し、
ひびの修復を促す

ビタミンE誘導体

皮ふ修復成分

アラントイン



しっかり覆って有効成分をとどめる
ワセリンベースの処方設計

炎症を鎮める

グリチルレチニ酸

殺菌作用

イソプロピルメチルフェノール

かゆみを抑える

ジフェンヒドラミン



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 潤滑やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

効能・効果

ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ、ひじ・ひざ・かかとのあれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

成分・分量(100g中)

- ビタミンA油…0.5 g(ビタミンA として500000国際単位)
- トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE 誘導体)…2.0g
- アラントイン…0.2g
- グリチルレチン酸…0.3g
- イソプロピルメチルフェノール…0.1g
- ジフェンヒドラミン…0.5g

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、パルミチン酸イソプロピル、パラフィン、ポリエチレン、マイクロクリスタリンワックス、パルミチン酸デキストリン、パラベン、BHTを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

ヒビプロ®αはカバーラーの高さにこだわっているためハードタイプの軟膏製剤になっています。冬期など気温が低い時に製剤が硬くなってしまい出しにくい時は、手で温めてからご使用ください。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)