




[メディカルローション]

## こんな大人のニキビに悩んでいませんか？

- アゴや口周りなど、フェイスラインに出来る
- 生理前やストレスを感じる時などに、繰り返し出来る
- 同じ場所に出来て、痕が残りやすい


### 【ニキビのできるメカニズム】

※「アクネ菌の巣」とは、アクネ菌同士が好んで集まっているかたまりのこと。



#### アクネ菌のバイオフィルムへの働き

アクネ菌が形成するバイオフィルムにより  
殺菌剤によっては効果を発揮しにくになります。  
殺菌成分: イソプロピルメチルフェノールは、  
バイオフィルムを壊してアクネ菌を殺菌し、  
ニキビの進行をおさえます。



### ニキビを治す3つの効果

#### 1 殺菌(イソプロピルメチルフェノール)

アクネ菌などを殺菌し、ニキビにしっかり効きます。

うるおい成分  
配合

#### 2 抗炎症(アラントイン)

できてしまったニキビの炎症・赤み・はれをしめます。  
傷ついた組織を修復する効果もあります。

オイルフリー

#### 3 角質軟化作用(サリチル酸)

角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまた毛穴を開きます。

### 【アクネス25シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルクリームc



フェイスラインにも使いやすい  
ローションタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルローションb



背中にも使いやすい  
ミストタイプ  
メンソレータム®アクネス25  
メディカルミストb

第2類医薬品 16g

第2類医薬品 100mL

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータムアクネス25メディカルローションb 第2類医薬品 ニキビ治療薬

100mL

## 使用上の注意 ▲

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲



### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人

(4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 深い傷やひどいやけどの人

(6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

4. その他

(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。

(2) 本剤の使用により、皮ふが多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。

そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

## 【効能・効果】

ニキビ

## 【用法・用量】

1日2回(朝晩)、コットン脱脂綿、ガーゼ等に適量をとり、肌にしばらくの間(2~3分間)押し当ててください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

(1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。

(2) 用法・用量を厳守してください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5) 外用にのみ使用してください。

## 【成分】

有効成分	分量
イソプロピルメチルフェノール	0.3%
アラントイン	0.2%
サリチル酸	0.5%

添加物として、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート20、エデト酸Na、L-アルギニン、クロロブタノール、トリエタノールアミン、ニコチン酸アミド、香料を含有します。

## 【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かないところに保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(5) 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0°C以下の保管はお避けください。

(6) 火の近くでの使用および保管はお避けください。

(7) 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。

(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020/大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401755701