

ロート製薬



# ルナフェミン

## 温経湯

うんけいとう

【効能・効果】体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくもの次の諸症：  
月経不順、月経困難、こしけ(おりもの)、更年期障害、不眠、神経症、  
湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ(手の湿疹・皮膚炎)

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

※食間とは、食後2～3時間を指す。

年齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
7才以上15才未満	3錠
7才未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(販売名)ルナフェミン

第2類医薬品



パウチでエコ

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

ルナフェミン専用相談室

女性スタッフが丁寧にお応えします。お気軽にお問い合わせください。  
受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

0120-280-610

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

漢方製剤 168錠

### △ 使用上の注意



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸の弱い人
  - (4) 高齢者
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人:むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

●まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】12錠中 温経湯エキス3520mg(ハンゲ2.0g、バクモンドウ2.0g、トウキ1.5g、センキュウ1.0g、シャクヤク1.0g、ニンジン1.0g、ケイヒ1.0g、ゼラチン1.0g、ポタンピ1.0g、カンゾウ1.0g、ゴシュユ0.5g、ショウキョウ0.25gより抽出)を含む。添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、炭酸水素K、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸Mg、マクロゴール、カラメル、ヒプロメロース、タルクを含む。※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先: 0120-149-931

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク<ルナフェミン専用相談室> 0120-280-610

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

使用期限  
製造番号

