


折りたたんで廃棄し
 やすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容
 後の容積は約 $\frac{1}{4}$ になります。

- ①折り目に沿ってつぶしてください。
- ②空気が入らないよう、キャップをしめてください。



折り目
 キャップ：PP
 バックシン：PE, PP
 ボトル：PE
 ラベル：PE

殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方
消毒用エタノール

アルコール類 * 水溶性 * 危険等級Ⅱ * 火気厳禁



健栄製薬株式会社
 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
 電話番号 06(6231)5626

殺菌・消毒に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

粘膜(口唇等)、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】 創傷面の殺菌・消毒

【用法用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。

(右側面へ続く)



(左側面より続く)

＜用法用量に関する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール(C₂H₆O) 76.9～81.4 vol%を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

400

300

200

100