服用前にこの説明書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう保管してください。

乗り物酔いの予防と緩和に



第2類医薬品

- 販売名:センパア Kidsドリンク ▶センパア Kidsドリンクは、お子さまの乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を
- ▶お子さま向きの風味のよい液剤ですので、旅行の途中で気分が悪くなった場合でも、その場 で服用できます。


使用上の注意

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた 一般的な注意事項を記載しています。

予防·緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにします。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・ 事故が起こりやすくなります)



(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあり



相談すること

- かの人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に 相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。

排尿困難

(6)次の診断を受けた人。

緑内障、心臓病

服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに 服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して ください

関係部位	症状 発疹・発赤、かゆみ 頭痛 排尿困難 顔のほてり、異常なまぶしさ	
皮膚		
精神神経系		
泌尿器		
その他		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師 の診療を受けてください。

1	症状の名称	症状	
	再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が 青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなり くらっとする、血尿等があらわれる。	
	無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。	

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は 増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ



効 能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和







頭痛

用法·用量

次の量を服用してください。乗物酔いの予防には乗車船30分前に 1回1本を服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合 には、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。

年 令	1回量	服用回数
3才~10才	1本(20mL)	1日2回まで
3 才未満	服用しないこと	

[注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

1本(20mL)中

 成分
 分量
 はたらき

 クロルフェニラミンマレイン酸塩
 1.3mg
 嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気・頭痛をおさえます。

スコポラミン臭化水素酸塩水和物

0.08mg

自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・ 吐き気をおさえます。

添加物:D-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、クエン酸、 クエン酸Na、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



-乗物酔いを避けるために、次の点にもご注意ください。

バスでは、気分よくすご しやすい、前方の席や窓 際の席を選びましょう。



飲みすぎや食べすぎは 避けましょう。



おしゃべりや景色をなが めて、気分よくすごしま しょう。



この製品についてのお問い合わせは、お買い 求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡 先 大正製薬株式会社 お客様119番室

話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号 http://www.taisho.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)