

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



かぜ・ねつなどの時の栄養補給に
発熱性消耗性疾患・病中病後などの栄養補給

ゼナジンジャー 滋温液

第2類医薬品 ゼナジンジャー 滋温液 (ビタミン含有保健薬)

- ◆ゼナジンジャー 滋温液は、かぜ・ねつなどで消耗した体に栄養を補給する滋養強壮ミニドリンク剤です。
- ◆生 姜、桂皮、芍薬や計14種類の生薬エキス(原生薬として計4320mg相当)、タウリン、ビタミンを配合した当社独自の処方です。
- ◆カフェインは入っていません。



使用上の注意



相談すること

- 1 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

- 2 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 3 しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

☆発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

☆滋養強壮
☆虚弱体質


こんな時に



病中病後に



体力が消耗している時に



カフェインが気になる
が疲れを感じる時に

用法・用量

次の量を服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1 本 (50mL) 	1日 1回
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成 分

1本(50mL)中

ショウキョウ(生姜)チンキ 0.6mL (生姜120mgに相当)	ニンジン(人参)エキス-P 85.8mg (人参600mgに相当)
ケイヒ(桂皮)流エキス 0.3mL (桂皮300mgに相当)	ムイラブアマエキス-A 15mg (ムイラブアマ300mgに相当)
シャクヤク(芍薬)エキス 30mg (芍薬120mgに相当)	カシュウ(何首烏)チンキ 0.76mL (何首烏250mgに相当)
カンゾウ(甘草)エキス 37.5mg (甘草150mgに相当)	ブクリョウ(茯苓)エキス-A 9.6mg (茯苓300mgに相当)
タイソウ(大棗)エキス 92mg (大棗230mgに相当)	ロクジョウ(鹿茸)チンキ 1.08mL (鹿茸300mgに相当)
ジオウ(地黄)エキス-A 150mg (地黄300mgに相当)	イカリ草(淫羊藿)エキス 100mg (淫羊藿1000mgに相当)
トウキ(当帰)流エキスS 0.05mL (当帰50mgに相当)	タウリン 500mg
オウギ(黄耆)流エキス-A 0.3mL (黄耆300mgに相当)	リボフラビリン酸エステルナトリウム 5mg (ビタミンB ₂)
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) 5mg

添加物：白糖、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポピドン、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール（アルコール1.38mL以下）

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号



<https://brand.taisho.co.jp/zena/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)