

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎液剤／すっきり爽快タイプ

トクホンチールA

チール A

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

- 次の部位には使用しないこと
 - 目の周囲、粘膜など
 - 湿疹、かぶれ、傷口



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【効能又は効果】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ、打撲、捻挫、骨折痛

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13才未満の人への使用はさけてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 入浴の1時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じことがあります。
- 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
- 使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
- 塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触ると、変色することがありますので注意してください。
- 強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹼でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。

※ボトルの塗布面で肌を軽くたたき、薬液をしみ込ませてから使用してください。

※使用後は、必ずキャップを閉めてください。

【成分及び分量】

有効成分 100mL 中

I-メントール	6.0g	ビタミンE 酢酸エステル	0.5g
サリチル酸グリコール	6.5g	グリチルリチン酸	0.1g
ノニル酸ワニリルアミド	8mg		

添加物としてアルコール、ゲラニオール、水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光を避け、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。
3. 誤用を防ぐため、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないよう注意してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
6. 火気に近づけないでください。

火気厳禁 第二石油類

水溶性 危険等級Ⅲ 100mL

大正製薬(株) お客様 119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

0120-149-931

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

31

製造販売元

株式会社トクホン

東京都豊島区高田3丁目26番3号

——本文は、直接外箱に記載されている事項です——