



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

**第3類
医薬品**

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和に

アスacol[®]2000

ビタミンC主薬製剤

- アスacol2000は、しみ、そばかすなどを緩和するビタミンCに、皮膚・粘膜を保護するリボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂誘導体）を配合しています。サツと溶ける酸味を抑えたのみやすい細粒剤です。
- 1日最大服用量（3包）のカロリーは、約8kcalと低カロリーです。
- 皮膚のメラニン色素の生成と沈着を抑制し、しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着を緩和します。
- 細胞同士を結合させる働きに関与するコラーゲンの生成を助け、毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血、鼻出血を予防します。
- 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期におけるビタミンCの補給にも適しています。



使用上の注意



■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期



しみ、そばかす



日やけ・かぶれによる色素沈着



肉体疲労時

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	1~3回
11~14才	1包	1~2回
7~10才	1包	1回
7才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)7才以上15才未満に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕 3包中(1包1.5g)

成分	分量	働き
アスコルビン酸 (ビタミンC)	2,000mg	メラニン色素の生成と沈着を抑制し、しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着を緩和すると共に、結合組織の主成分であるコラーゲンの生成に関与し、毛細血管を丈夫にして歯ぐきからの出血、鼻出血を予防します。
リポフラビン酪酸 エステル	12mg	「皮膚・粘膜のビタミン」といわれており、ビタミンCの働きを助けます。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、無水ケイ酸、白糖、CMC-Na、ステビアエキス、香料、アルコールを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

- (1)本剤はリポフラビン酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 **03-5412-7393**
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
製造販売元
第一薬品工業株式会社
富山県富山市草島15-1

