

湿疹・皮膚炎
治療薬

新リビメックス[®]クリーム

本剤を長期間使用すると、皮膚の血管が拡張して赤みが発生したり、皮膚が薄くなったりすることがあります。顔面では皮膚の赤みが発生しやすいことから、特に注意してください。本剤を化粧下、ひげそり後に使用しないでください。また、症状が改善した後は漫然と連用しないでください。

新リビメックス[®]クリームは、湿疹、皮膚炎、かぶれ等の炎症を元から鎮め、すぐれた効きめをあらわす皮膚用薬です。

製品特長

- ・「すぐれた抗炎症作用」を有するプレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)を0.3%配合。
- ・プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)はアンテドラッグとよばれるステロイドです。塗擦した患部ですぐれた効果を発揮し、体内では分解され作用がおだやかになる成分で有効性と安全性を考えて設計されています。

患部で
よく効き

体内では
分解され作用が
おだやかに

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ② 顔面には、広範囲に使用しないでください
- ③ 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、あせも、虫さされ、じんましん

(裏面へ続く)

成分・分量 (1g中)

成分・分量	働 き
プレドニゾン吉草酸 エステル酢酸エステル 3mg	患部でよく効き、体内では分解され作用がおだやかになるアンテドラッグ・ステロイド成分で、湿疹、皮膚炎、かぶれ等の炎症を元から鎮めます。

[添加物]ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、パラベン、エデト酸Na、クエン酸、水酸化Na

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④外用にのみ使用してください。
- ⑤薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部分に使う場合は、ぴったりとしたおむつやビニール製の密封性のあるパンツは使用しないでください。



[容器の使い方]



キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。

- 使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。
- チューブを折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。(チューブが破れる原因となります。)

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ


お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

製造販売元

 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14