

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲, 粘膜等. (2)湿疹, かぶれ, 傷口.

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この外箱を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ, 痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し, この外箱を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労, しもやけ, 骨折痛

用法及び用量

1日1~2回, ライナーをはがし, 患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり, 患部がぬれている時は, よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は, 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に, 1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り, 発疹・発赤, かゆみ, かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の特に弱い人は, 同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 電話 076-479-1313
受付時間 9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く)

成分及び分量 1.0㎡中

dl-カンフル…………… 1.80g
サリチル酸メチル…………… 9.00g
ハッカ油…………… 1.20g
l-メントール…………… 4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…… 0.50g
ノニル酸ワニリルアミド…………… 0.01g
添加物として, ポリブテン, 生ゴム, ポリイソブチレン, エステルガム, テルペン樹脂, 沈降炭酸カルシウム, 酸化チタン, アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 天然ゴムラテックス, 香料, 赤色405号, 黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は, 添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
富山市水橋島等173