

医薬品ゴキジェットプロ秒殺+まちぶせ

(販売名:ゴキジェットD1)


<殺ゴキブリ剤>

[注意—人体に使用しないこと]


ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

また、必要ときに読めるように大切に保存してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと  (守らないと副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 人体に向かって噴射しないでください。また噴射気体を吸入しないでください。
2. アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
3. 40秒以上連続噴射しないでください。

相談すること 

1. 万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤とオキサジアゾール系の殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
2. 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

1. 定められた使用方法、使用量を厳守してください。
2. 皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
3. 噴射中に、薬剤が皮膚や眼にかからないように注意してください。
4. 薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
5. 噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
6. 変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
7. 火気、(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
8. 換気してください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直接日光や火気を選び子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
2. 缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

【廃棄の方法】

1. 本品は使い切ってから捨てること。
2. 捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨てること。その際噴射レバーを引いたまま、黒色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
3. 大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせ下さい。

[成分及び分量]

【有効成分】 450mL中 イミプロトリン(ピレスロイド系) 0.5g (プラルとして1.0g)

メキサジアゾン(オキサジアゾール系) 0.41g

【その他の成分】 無水ケイ酸、オレンジ油、無水エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

[効能又は効果]

ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニの駆除

[用法及び用量]

使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。

噴射レバーを引き、小型の害虫(チャバネゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニ)には約1～2秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6～8秒直接噴射してください。また、害虫の逃げ込んだ隙間には1～2秒噴射してください。隙間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。

害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所に約20cmの距離から帯状にじゅうぶん濡れる程度噴射塗布してください。使用量の目安:1㎡あたり45～60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5～6秒程度)

アース製薬株式会社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

(お客様窓口)TEL(03)5207-6456

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)