

化膿を防ぐ
タマガワ
殺菌消毒薬 **新リバーゼA**



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 使用后、発疹・発赤、かゆみが皮ふにあらわれた場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

切傷・擦過傷(すり傷)・化膿性創傷。

用法・用量

ピンセットでガーゼを取り、患部に貼付して油紙を当て、軽くホータイをして下さい。1日1回交換。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。
- (4) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用して下さい。

成分・分量

1.2g中 アクリノール水和物0.4%液……………1.0g
ガーゼ……………0.2g
添加物 グリセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので、注意して下さい。
- (5) 使用期限のすぎた製品は使用しないで下さい。(箱側面に記載)

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL 03-3861-2037
受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

製造販売元

タマガワ
玉川衛材株式会社
東京都千代田区岩本町2-2-16



ホームページ
<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>

YG20060-S