

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

生薬製剤 せい か 精 禍

精禍は腰部、腰痛、筋肉痙攣を改善するために、10種類の生薬を配合した独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能

腰部、腰痛、筋肉痙攣

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用する。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人	1 包	3 回
7才以上15才以下	成人の1/2量	
4才以上7才未満	成人の1/3量	
2才以上4才未満	成人の1/6量	
2才未満	成人の1/10量	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量 成人1日量〈3包(1包×3)〉中

成 分	分 量	成 分	分 量
ケイヒ末	0.64g	カンゾウ末	0.24g
シャクヤク末	0.64g	センキュウ末	0.64g
トウキ末	0.64g	ニンジン末	0.64g
ジオウ末	0.64g	ゴシツ末	0.64g
トチュウ末	0.64g	ジンギョウ末	0.64g

添加物：なし

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料としていますので、製品により色調や風味などが多少異なることがあります。効果には変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり、品質が変わる）。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

ピップ株式会社 お客様相談室

電話 (06)6945-4427

受付時間 土・日・祝日を除く10:00～17:00

発 売 元



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

製造販売元

株式会社 建林松鶴堂

戸田市戸田公園3-7
〒335-0024

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931