


ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃痛・胃もたれ・胸やけにスクラート胃腸薬(顆粒)

こんな方に効きます



胃の痛み



胃もたれ



胸やけ



むかつき

胃の中が空っぽの
空腹時・睡眠中こそ効く
胃痛のもとに直接効く
「患部修復機能」胃腸薬

- 胃痛のもと(荒れた患部)を保護・修復します
スクラートが胃の荒れた患部を選んで吸着し、胃酸などの攻撃から保護するとともに、患部を修復して、もとから治していきます。さらに、アズレンスルホン酸ナトリウムとL-グルタミンが炎症をしずめ患部の修復を促進します。
- すばやく、かつ持続的に胃酸を中和します
ケイ酸アルミン酸マグネシウムと合成ヒドロタルサイトが症状のもととなる胃酸をすばやくかつ持続的に中和します。さらに、ロートエキスが胃の神経をしずめ、胃酸の分泌を抑えます。
- すばやく溶ける顆粒剤です

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、はきけ、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

胃痛、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃重、胃部膨満感、胃部不快感、胸つかえ、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量


次の量を食間*及び就寝前に服用してください。

*食間とは、食後2～3時間経過し、胃の中に食べ物がほぼなくなっている時です。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	×服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。

成分 1日服用量(3包・4.29g)中



○白色の顆粒	・スクラルファート水和物 …………… 1500mg ・ケイ酸アルミン酸マグネシウム …… 1125mg ・ロートエキス …………… 30mg
○淡紫青色の顆粒	・アズレンスルホン酸ナトリウム …… 6mg ・L-グルタミン …………… 400mg ・合成ヒドロタルサイト …………… 270mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、カルボキシメチルスターチNa、CMC、二酸化ケイ素、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の青みがかかった色は有効成分(アズレンスルホン酸ナトリウム)の色です。
服用に支障はありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7