

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイル40 プレミアム ザ・ワンクールMAX

眼科用薬

第2類医薬品

スマイル40 プレミアム THE ONE

眼疲労 かすみ 充血 かゆみの共通原因のひとつ

角膜ダメージ^{※1}を修復するビタミンA配合

これらすべての症状を1本で治す!

国内(基準^{※2}内)最多12種の有効成分配合

原因アプローチ × 症状アプローチ

※1 軽度なこすれによる

※2 基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

防腐剤
無添加

スマイルの独自技術により防腐効果を持たせています。防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)を配合していません。使用期限や保管方法も防腐剤配合の目薬と同様にお使いいただけます。

清涼感レベル

マイルド ↓ クール ↓

弱 0 1 2 3 4 5 6 7 強

クールMAX ↑

●点眼方法について



容器の先を真下に向けて点眼してください。

傾けたまま点眼すると、キャップを閉めたときに容器の先に残った液が垂れることがあります。液がキャップや容器の先についた場合には、清潔なガーゼ等で軽くふき取ってからキャップを閉めてください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用后、一時的にかすんでみえる場合がありますので注意してください。

必ず裏面もお読みください

●効能

- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 結膜充血
- 目のかゆみ
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	50,000単位	角膜に直接働き、視覚機能をサポートするビタミンです。
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.045g	血行を促進して、栄養を目に補給するビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.01g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1g	うるおいを保ち角膜を保護します。
タウリン	1g	新陳代謝を促す作用があるアミノ酸類です。
L-アスパラギン酸カリウム	0.8g	目に酸素を取り込むアミノ酸類です。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005g	目のピント調節機能を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
塩酸テトラヒドロソリン	0.02g	目の充血を抑えます。
イブシロン-アミノカプロン酸	1g	目の炎症を鎮めます。
ベルベリン塩化物水和物	0.015g	抗菌・抗炎症作用のある生薬由来の成分です。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25g	抗炎症作用のある生薬由来の成分です。

添加物として、ホウ酸、トロンタモール、エデト酸Na、BHT、プロピレングリコール、ポビドン、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、d-ボルネオール、ユーカリ油、pH調整剤を含む。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。
その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (7) 液色は生薬由来の成分を配合しているため黄色です。衣類などにつくと着色することがありますので、つかないように充分注意してください。
- (8) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。
透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。
◇自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

—お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28