

モアリップ[®]N

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕（1g中）

アラントイン	5mg
グリチルレチン酸	3mg
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	2mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	1mg
パンテノール	5mg

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン、パラベン、l-メントール、ワセリン、その他1成分を含有します。

〔適応症〕

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 口唇への外用にのみ使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります）。
※冬季など気温の低い時に中味が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手の中で温めてからご使用ください。※ご使用後は、チューブの口もとをきれいにふいてください。

お問い合わせ先

発売元 資生堂薬品株式会社 お客さま窓口 03-3573-6673

受付時間 9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931