

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

鎮咳去痰薬

バストレート

バストレートは、水なしで服用する顆粒剤で、のどのあれ・のどの不快感をやわらげるお薬です。3歳のお子様からご使用いただけます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。高熱
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

【用法・用量】

次の量を水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	6回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

（裏面もお読みください）

【成分・分量】

6包（4.2g、成人1日量）中

成 分	分 量
キキョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン末	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセンヤク末	8.4mg

添加物として、バレイショデンブン、エリスリトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、フマル酸Na、l-メントール、青色1号、黄色5号、エタノール、トコフェロール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

日本薬剤株式会社 「お客様相談窓口」

電話番号 076-424-2239

[月～金 9：00～17：00（祝日を除く）]

製造販売元 **日本薬剤株式会社**
富山市東中野町一丁目1番1号

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）