

第2類医薬品
殺菌消毒薬

日本薬局方
クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution
500mL



発売元 製造販売元
大洋製薬株式会社 大成薬品工業株式会社
東京都文京区本郷3-14-11 福岡県筑後市大字熊野字屋敷999-1

2012年10月(記載事項変更に伴う改訂)
この説明書は、本剤の使用前に必ずお読み下さい

使用上の注意

△ してはいけないこと
〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕
1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
2. 次の部位には使用しないこと。
目、目のまわり、口、鼻等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。

● 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
1) 医師の治療を受けている人。
2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
3) 患部が広範囲の人。
4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果
手指・創傷面の殺菌・消毒
便所、便器、こみ箱、たんづば、浄化そう等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量
次のように水で希釈して洗浄する。
1. 手指の消毒の場合：2% (本剤の50倍液)
2. 創傷面の殺菌の場合：1% (本剤の100倍液)
3. 便所等の消毒の場合：3% (本剤の33倍液)
＜用法・用量に関連する注意＞
1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 小児に使用するには、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
4. 本品は、使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所に十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。
＜希釈方法＞
3.3倍液：本剤を30mLと水1Lにうすめる。
5.0倍液：本剤を20mLと水1Lにうすめる。
100倍液：本剤を10mLと水1Lにうすめる。

成分・分量
本品は、クレゾール42～52 vol%を含む。

保管及び取扱い上の注意
1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
2. 小児の手が届かないところに保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
4. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起すので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取扱う場合は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用すること。)

大塚製薬お客様相談窓口
0120-184328
受付時間 平日9時～17時(月～土) 夜間・休日は18時～

副作用被害救済制度
0120-149-931

外装フィルム
ガラス・瓶
金属・キャップ

4 975175 010993

使用期限

製造番号