

# 草退治ストロングシリーズ 粒タイプ

## クサノン GT 粒剤

有効成分：ターバシル…1.0%

フルミオキサジン…0.20%

ヘキサジノン…1.0%

農林水産省登録 第 24675 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数  
の制限を示す。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数
樹木等	駐車場、道路、運動場、宅地等	一年生雑草	雑草発生前	5~20g/m <sup>2</sup>	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面 土壌散布	本剤：2回以内 ターバシル：2回以内 フルミオキサジン：3回以内 ヘキサジノン：2回以内
			雑草生育初期	10~20g/m <sup>2</sup>		
			雑草生育期	20~30g/m <sup>2</sup>		
		多年生雑草	雑草生育初期	10~20g/m <sup>2</sup>		
			雑草生育期	20~30g/m <sup>2</sup>		
		スギナ	雑草生育初期	15~20g/m <sup>2</sup>		
			雑草生育期	20~30g/m <sup>2</sup>		
		ササ	雑草生育初期	5~15g/株 (ただし 30g/m <sup>2</sup> まで)	株元処理	
		ススキ				

【1包装単位で散布できる面積】

適用雑草名	800g	1.5 kg	3 kg	5 kg
一年生雑草 (雑草発生前)	40～160㎡ (約12.2～48.4坪)	75～300㎡ (約22.8～90.9坪)	150～600㎡ (約45.5～181.8坪)	250～1000㎡ (約75.8～303坪)
一年生雑草 (雑草生育初期)	40～80㎡ (約12.2～24.2坪)	75～150㎡ (約22.8～45.4坪)	150～300㎡ (約45.5～90.9坪)	250～500㎡ (約75.8～151.5坪)
一年生雑草 (雑草生育期)	26.7～40㎡ (約8.1～12.1坪)	50～75㎡ (約15.2～22.7坪)	100～150㎡ (約30.3～45.4坪)	166.7～250㎡ (約50.6～75.7坪)
多年生雑草 (雑草生育初期)	40～80㎡ (約12.2～24.2坪)	75～150㎡ (約22.8～45.4坪)	150～300㎡ (約45.5～90.9坪)	250～500㎡ (約75.8～151.5坪)
多年生雑草 (雑草生育期)	26.7～40㎡ (約8.1～12.1坪)	50～75㎡ (約15.2～22.7坪)	100～150㎡ (約30.3～45.4坪)	166.7～250㎡ (約50.6～75.7坪)
スギナ (雑草生育初期)	40～53.3㎡ (約12.2～16.1坪)	75～100㎡ (約22.8～30.3坪)	150～200㎡ (約45.5～60.6坪)	250～333.3㎡ (約75.8～101.1坪)
スギナ (雑草生育期)	26.7～40㎡ (約8.1～12.1坪)	50～75㎡ (約15.2～22.7坪)	100～150㎡ (約30.3～45.4坪)	166.7～250㎡ (約50.6～75.7坪)
ササ (雑草生育初期)	26.7～40㎡ (約8.1～12.1坪)	50～75㎡ (約15.2～22.7坪)	100～150㎡ (約30.3～45.4坪)	166.7～250㎡ (約50.6～75.7坪)
ススキ (雑草生育初期)	53.4～160㎡ (約16.2～48.4坪)	100～300㎡ (約30.3～90.9坪)	200～600㎡ (約60.7～181.8坪)	300～1000㎡ (約91.1～303坪)

効き始めるまでの目安	最速3日※1
効果持続の目安	最長1年※2

※1 雑草発生前～雑草生育初期に本剤を散布した場合の刈り取り不要期間の目安で、雑草がまったく発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件、雑草の種類によって差が生じます。※2 草丈40cm以下の一年生雑草での事例