

2012年9月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

制酸薬

胃がスーッとなる緑の胃ぐすり

サクロン錠

第2類医薬品

胃のムカムカや胸やけは、胃酸が出過ぎることで起こることがあります。また、過度な飲酒によりアルコールが胃粘膜自体を直接刺激することも原因となります。

サクロン錠は、出過ぎた胃酸の働きを弱め(中和)、分泌を抑制し、荒れた胃粘膜を葉緑素から作られた緑の成分で修復・保護します。ムカムカ・胸やけ・飲みすぎに、**サクロン錠**はスーッと飲めば、スーッと効きます。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

- ①本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
- ②授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

- ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
排尿困難
(6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
- ④2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。


効能・効果

胸やけ、飲みすぎ、胃痛、胃酸過多、胃もたれ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を食間および就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	4錠 	1日3回
8歳以上15歳未満	2錠 	
8歳未満	✕ 服用しないこと	

*食間とは、食後2時間ほど経過し、胃の中に食べた物がほぼなくなっている時です。

[用法・用量に関連する注意]

小児(8歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

成人1日量12錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
銅クロロフィリンカリウム	120mg	荒れた胃の粘膜を修復・保護します。
無水リン酸水素カルシウム	1,020mg	
沈降炭酸カルシウム	1,020mg	出過ぎた胃酸を直接中和します。
水酸化マグネシウム	960mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを止めます。
ロートエキス	30mg	

[添加物]

トウモロコシデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、香料、塩化K、ケイヒ、ステアリン酸Mg、ポビドン

[成分に関連する注意]

- ①服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンカリウム(緑色)が排泄されるための着色であり、心配はありません。
- ②サクロン錠には、アルミニウムを含む成分は使用していません。

ひとくちメモ サクロン錠が緑色をしているのは…

胃酸やアルコールで荒れた胃の粘膜を修復・保護するため、サクロン錠は葉緑素から作られた緑の成分を含有しています。サクロン錠が鮮やかな緑色をしているのはこのためです。

葉緑素
成分
配合

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④4錠入り分包は、次のことに注意してください。
分包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- ⑤96錠包装は、次のことに注意してください。
(1)容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。また容器は密栓して保管してください。
(2)使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。
- ⑥使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



サクロン錠の製品内容は
ホームページでも紹介しています。

i-no-science.com

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU15824-7IX