

生薬製剤 押して開ける

第3類
医薬品

販売名:新ヨクイニンタブレットクラシエ

〈効能〉

いぼ、皮膚のあれ

〈成分〉

成人1日の服用量9錠(1錠220mg)中
ヨクイニンエキス…1,000mg

[ヨクイニン20gより抽出。]

添加物として、二酸化ケイ素、セルロース、クロスCMC-Na、
ステアリン酸Mgを含有する。

【成分に関連する注意】

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いています
ので、錠剤の色が多少異なることや、錠剤の表面
に黒褐色の斑点が見られることがあります。また、
ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎ 0120-149-931

ご使用に際して、
外箱の説明文を
必ずお読みくだ
さい。また、必要
な時に読めるよ
うに大切に保管
してください。

肌への栄養補給や
水分代謝を促し、
ターンオーバーを

正常化させて、
いぼや古い角質を排出。
肌をなめらかに整えます。



※イメージ

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ
等を起こしたことがある人
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場
合には、服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

04981

クラシエの漢方

YOKUININ
ヨクイニン

YOKUININ is for the treatment of
rough skin and warts.

ヨクイニンタブレット

錠剤タイプ



第3類医薬品

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯
にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
15才未満7才以上	2錠	
7才未満5才以上	1錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督の
もとに服用させてください。

〈保管及び取扱上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になりたり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを
防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので
ですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきまると、変色または色むらを
生じることがありますので、誤って水滴を落と
したり、ぬれた手で触れないでください。

発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元 クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)