

# 第3類医薬品 15g

しっしん・かぶれ・かゆみに  
販売名:キンカンハイハイクリーム  
＜外用鎮痒消炎剤＞

ご使用に際して、この説明文書を必ず  
お読みください。また、必要な時に読  
めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの  
で、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止  
し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談  
してください。

■ 効能又は効果 ■ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しも  
やけ、虫さされ、じんましん

■ 用法及び用量 ■ 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態に合わ  
せてご使用ください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用さ  
せてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合に  
は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場  
合には、眼科医の診療を受けてください。
- 口に入らないように注意してください。万一、口に入った場合に  
は、すぐに水又はぬるま湯で洗うか、口の中の薬剤を拭き取っ  
てください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療  
を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

### ■ 成分及び分量 ■ 100g中

成 分	分 量
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.00g
グリチルリチン酸二カリウム	0.50g
アラントイン	0.20g
イソプロピルメチルフェノール	0.50g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

添加物として1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸  
グリセリン、シュガースクワラン、セタノール、ステアリルアル  
コール、ステアリン酸ポリオキシシル、自己乳化型ステアリン  
酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシ  
ビニルポリマー、ジメチルポリシロキサンを含有します。

### ■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、保管してく  
ださい。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因にな  
ることや品質が変わることを防ぐため。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用  
してください。

### ■ 消費者相談窓口 ■

株式会社金冠堂 お客様相談室  
TEL 03-3421-6171(代表)  
受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

発売元 株式会社金冠堂  
〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号  
製造販売元 株式会社 雪の元 本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

