

2011年10月 記載要領変更に伴う改訂
*:2012年10月 効能一部削除

この添付文書は本剤とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

第②類医薬品

湿疹・皮膚炎
治療薬

リビメックスコーグ軟膏

リビメックスコーグは、OTC医薬品として初めて導入されたアンテドラッグと呼ばれるステロイド外用薬です。

アンテドラッグとは、塗布した患部で皮膚の炎症によく効き、体内で低活性物質に変わるタイプの薬剤です。お使いになりますと、有効成分が湿疹、皮膚炎、かぶれなどの炎症を抑え、すぐれた効きめをあらわします。



リビメックスコーグは、身近なご家庭で、より適切に湿疹、皮膚炎、かぶれなどの手当てができるすぐれた皮膚病のお薬であります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 患部が広範囲の人。

(5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量(1g中)

成分・分量	働き
プレドニゾロン吉草酸 エステル酢酸エステル 1.5mg	炎症患部でよく効き、体内で低活性に変わるアンテドラッグ・ステロイド成分で、湿疹、皮膚炎、じんましん等の炎症を鎮めます。

[添加物]ワセリン、流動パラフィン、パラベン

効能・効果*

湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



目には使用しないでください

[容器の正しい使い方]



キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。
●使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

