

■使用上の注意/【してはいけないこと】守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。1.次の人は服用しないでください【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)次の診断を受けた人。腎臓病、2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。■保管及び取扱い上の注意/(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

販売名 液キャベコーワG **第2類医薬品**

●お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

胃腸薬 **Konco**  
**液キャベコーワG**

もたれ はきけ 飲みすぎ

■効能・効果/飲み過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃痛、消化不良、食欲不振、胃重、もたれ、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃炎 ■成分・分量(50mL中)/合成ヒドロタルサイト600mg オキソアミラン末45mg ニンジンエキス135mg クロン末200mg ヒハツ末50mg ハッカ油9mg オウレン末エキス0.3mL ケンショウエキス100mg カンゾウエキス86mg (添加物)セチルロース、カルメロースNa、ポビドン、パラベン、安息香酸Na、白糖、香料、エタノール

■用法・用量/成人(15歳以上)  
1日1回、1本を服用してください。  
●用法・用量を厳守してください。  
●器内服液なので服用の際、瓶をよく振ってください。

50mL

製造販売元  
**興和株式会社**  
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

ガラス：瓶  
金属：キャップ



製造番号

使用期限

