

■使用上の注意【してはいけないこと】守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。1.次の人は服用しないでください【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)次の診断を受けた人。胃腸病 2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。■保管及び取扱：止の注意(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

販売名 液キャベコーワ **第2類医薬品**

●お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL.03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

胃腸薬 **Kowa**
液キャベコーワ
もたれ ムカムカ はきけ

■効能・効果もたれ、はきけ(二日酔・悪酔のみかつき、もかつき、胃のみかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃痛

■成分・分量(5.0mL中)/合成ヒドロタルサイト400mg オキソアジマン末30mg 人参乾燥エキス90mg オウレン流エキス-B.0.3mL 生姜流エキス0.3mL コシユ流エキス0.5mL 薔浦流エキス0.4mL ウルソデオキシコール酸15mg カンゾウエキス末80mg(添加物)白糖、安息香酸Na、パラベン、セルロース、カルメロースNa、ポゼトシ、トメントール、香料、エタノール

■用法・用量/成人(15歳以上)
1日1回、1本を服用してください。
●用法・用量を厳守してください。
●懸濁内服液なので服用の際、瓶をよく振ってください。

50mL

製造販売元 **興和株式会社**
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

ガラス：瓶 **OTB**
金属：キャップ ● 医薬品

製造番号
使用期限

