


Kowa

赤くはれる虫さされ
しつこく残るかゆみ

ウナ^{ユ-フ} ジェル

虫さされ・かゆみに

透明ジェルタイプ



虫さされ・かゆみに
トリプルアプローチ

かゆみの元へ浸透して
しっかり治療します

15g

◀開け口

第②類医薬品

この台紙は本剤とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

虫さされ・
かゆみ用薬

ウナジェル

第②類医薬品

△使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の部位には使用しないでください (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面。(3) 目や目の周囲、粘膜等。2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

■相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|--------|-------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、しもやけ、じんましん

成分・分量(1g中) デキサメタゾン酢酸エステル0.25mg ジフェンヒドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg l-メントール35.0mg dl-カンフル30.0mg〔添加物〕ヒプロメロース、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、エデト酸Na、ジソプロパノールアミン、エタノール

用法・用量 1日数回適量を患部に塗布してください。＜用法・用量に関連する注意＞(1) 用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。

保管及び取扱上の注意 (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。(5) 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。(6) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(7) 火気に近づけないでください。(8) 使用期限(台紙及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

＜ステロイド成分配合＞

お問い合わせ先
興和株式会社 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



4 987067 810802



成形シート: PET
キャップ: PP
チューブ: PE, 金属

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14