

2012年9月(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージおよびビンラベルに記載)
を過ぎた製品は服用しないこと

第2類医薬品

貧血用薬

貧血に

ファイチ®

販売名:ファイチ

製品特徴

1. 吸収のよい溶性ピロリン酸第二鉄を主成分とし、効果的にヘモグロビンを造り、貧血を改善
2. 赤血球を造るのに必要な葉酸とビタミンB12をバランスよく配合
3. コーティング錠だから、鉄の味やニオイがしない
4. 腸で溶ける錠剤だから、効果的に成分を体内に吸収
5. 1日1回の服用で効く

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の貧血用薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること:便秘、下痢
4. 2週間くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

貧血

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日1回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
 - (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
 - (3)服用の前後30分はお茶・コーヒーなどを飲まないこと
 - (4)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 本品は水またはお湯で、かまずに服用すること

成分・分量 1日量(2錠)中

溶性ピロリン酸第二鉄……………79.5mg

シアノコバラミン(ビタミンB12)……………50μg

葉酸……………2mg

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースフタル酸エステル、クエン酸トリエチル、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、赤色102号、カルナウバロウを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)品質保持のため、錠剤を取り出す時はキャップに取り、手に触れた錠剤はビンに戻さないこと
- (5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6)乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ| <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
日新製薬株式会社
〒994-0069 山形県天童市清池東2-3-1

MADE IN JAPAN

30112D

10120277