

2013年3月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

# 水虫・たむし用薬 小林タムシチンキ<sup>b</sup>

販売名:小林タムシチンキb

第2類医薬品

## 特徴

みずむし・たむし(いんきんたむし、ぜにたむし)は真菌の一種の白せん菌が皮ふに寄生して生じる治りにくい皮ふ病です

小林タムシチンキbはこの真菌を殺すミコナゾール硝酸塩を主成分とし、角質を軟化させるサリチル酸、二次感染の予防にイソプロピルメチルフェノールを効果的に配合した水虫・たむし治療薬です

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など
- (2) 湿疹(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面または広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かかはっきりしない人(陰のうにかゆみ、ただれなどの症状がある場合は、湿疹などの他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱

3. 2週間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面にづく)

## 効能・効果

みずむし、いんきんだむし、ぜにたむし

## 用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4) 外用にのみ使用すること

## 成分・分量 100mL中

成分	分量	成分	分量
ミコナゾール硝酸塩	1g	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g
サリチル酸	4g	リドカイン	2g
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	d i - カ ン フ ル	1.5g


添加物として、エタノールを含有する

## 保管および取り扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること (2) 小児の手の届かないところに保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと (エタノール含有物) (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

- 使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること
- 本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床などにつかないようにすること

## 塗布具の使用方法



①  
キャップをはずして、



②  
キャップの内側の  
ネジに塗布具をねじ  
込んでください。



③  
使用後は塗布具を  
付けたままキャップ  
をしっかりしめて  
ください。

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

10125727

MADE IN JAPAN