

押して
開ける

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

【効能・効果】
肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとしめて立てて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)●キャップをしっかりしめないと液がもれることがある●プラスチック製品(眼鏡わくし、便座など)、化織の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

製品のお問い合わせは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問い合わせ先(お客様相談室)
☎ 0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

特徴

- 消炎鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、肩こり、筋肉の痛みを鎮めます
- 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、満りがちな患部の血行を改善します
- I-メントール6%配合で、爽快な使い心地です
- 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです
- ニオイが気にならない無臭性です

第2類医薬品 外用消炎鎮痛剤

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことのある人 (2)ぜんそくを起こしたことのある人 (3)妊娠または妊娠していると思われる人 (4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜など (2)湿疹かぶれ、傷口または化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

MADE IN JAPAN 10120807

【成分・分量】 100mL中

フェルビナク……………3 g
ノナン酸バニリルアミド……………12 mg
I-メントール……………6 g
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………100 mg
添加物として、グリチルレチン酸、プロピレンジコール、ジソブロボノールアミン、pH調整剤、B.H.T.、エタノールを含有する

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関する注意〉

(1)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
(2)外用にのみ使用すること
●塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと●皮ふの特に弱い方は、同じところに続けて使用しないこと●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

火気厳禁 アルコール類 危険等級II

エタノール含有物 水溶性

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931